


**Aus der Universitätsklinik und Poliklinik  
für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten Bonn.**

Direktor: Prof. Dr. med. Proell

---

# Über den heutigen Stand der Wurzelbehandlung.

Kritische Studie über Methoden und Materialien.



## **INAUGURAL-DISSERTATION**

zur

**Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde**

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt am 23. November 1936.

von

**Fritz Vollmann**

Zahnarzt aus Meinerzhagen.

---

B O N N 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt  
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät  
der Universität Bonn.  
Referent: Prof. Dr. Proell.



*Meinen lieben Eltern  
in Dankbarkeit gewidmet!*



Die Erhaltung des Zahnes ist die Aufgabe der konservierenden Zahnheilkunde. Bei gesunder Pulpa wollen wir verlorenes und zerstörtes Zahnhartgewebe ersetzen, und so den Zahn wieder funktionsfähig machen. Denselben Erfolg erstreben wir bei entzündeter oder zerstörter Pulpa, doch kommt hier die Behandlung der erkrankten Pulpa selbst hinzu. Diese bewegt sich je nach der Schwere des betreffenden Falles nach drei Richtungen. Sie besteht in der vollen Erhaltung des Organes oder in einer teilweisen Entfernung desselben, nämlich der Kronpulpa (Pulpaamputation) oder in der Abtötung mit nachfolgender Entfernung der gesamten Pulpa (Pulpaexstirpation). Solange wir auf diese Arten einen Zahn erhalten können, muß der Weg unbedingt beschritten werden, vorausgesetzt, daß sein Zustand die aufzuwendende Mühe lohnt und mit einem Erfolg gerechnet werden kann.

Welche Schwierigkeiten uns auch heute noch bei der Wurzelbehandlung entgegentreten und einen Dauererfolg verhindern, soll im nachfolgenden eingehend untersucht werden.

Die ersten genauen Angaben über die Zahl der Wurzelkanäle, Beschreibungen über deren Verlauf und Abbildungen über die Gestalt der Pulpenhöhlen bringt Carabelli in seinem „Systematischen Handbuch der Zahnheilkunde“, Wien 1848. Witzel erkannte 1879 als erster die Unmöglichkeit alle Wurzelkanäle unserem Instrumentarium zugänglich zu machen und auf mechanischem Wege den infizierten Inhalt zu entfernen. Die Kenntnis der normalen topographischen Anatomie der Pulpa ist von größter Wichtigkeit und muß bei jeder Wurzelbehandlung genauestens beachtet werden. Hinzu kommen fast stets irgendwelche Anomalien, die dazu beitragen, daß wir nicht immer mit einem Dauerfolg rechnen können.

Schon bei unkomplizierten, einwurzligen Zähnen, bei denen es ohne weiteres gelingt, die den Wurzelkanal ausfüllende Pulpa in toto zu entfernen, kann insofern ein Mißerfolg bedingt sein, als das

weitverzweigte Netz der Odontoplastenfortsätze in den Zahnbeinkanälchen nicht entfernt werden kann, sondern naturnotwendig zurückbleiben muß. Daß auch in diesen, je nach dem Grad der Entzündung, infektiöse Keime vorhanden sind, bzw. vorhanden sein können, ist selbstverständlich.

Oft gelingt es aber überhaupt nicht, die Pulpa aus den Wurzelkanälen zu entfernen, weil dieselben zwar gerade, aber zu eng, also unserem Instrumentarium nicht zugänglich sind.

Die Verhältnisse können sich weiter dadurch komplizieren, daß bei genügend weitem Lumen die Wurzel mehrere Foramina besitzt, wie aus vielen Röntgenbildern zu ersehen ist. Deltaförmige Verzweigungen und Ramifikationen in verschiedener Größe und Zahl kommen häufiger vor. Infiziertes Pulpagewebe wird bei der Exstirpation also hier immer zurückbleiben müssen. Auch Vereinigungen anfänglich getrennter bzw. selbständiger Wurzelkanäle sind nicht selten. Hinzu kommen noch, vor allen Dingen bei mehrwurzeligen Zähnen, Querverbindungen einzelner Wurzelpulpenstränge. Preiswerk, Fischer, Heß und andere haben gezeigt, welche feine Verzweigungen und netzartige Maschen die Pulpa fast aller Zahngattungen der menschlichen Zähne bildet. Fischer machte auf die deltaartigen Verzweigungen am Apex aufmerksam. Bei einfachen Röntgenaufnahmen sind schon die anatomischen Schwierigkeiten zu erkennen. Überzeugend werden die Schwierigkeiten bei mikroskopischer Betrachtung von Wurzelschliffpräparaten. Feine Abzweigungen von der Wurzelpulpa sind feststellbar. Diese stellen die Verbindung der Pulpa mit der Wurzelhaut dar. Solch feine Verästelungen treten manchmal in großer Zahl auf, vor allen Dingen in der Nähe der Wurzelspitze. Es können aber auch z. B. in halber Höhe einer Wurzelpulpa horizontal laufende starke Pulpaabzweigungen vorkommen. Mit der Nervnadel kann ihr Inhalt nie entfernt werden.

Der Durchgang eines Wurzelkanals wird ganz unmöglich gemacht, wenn wir gekrümmte, scharf abgeknickte Wurzeln vor uns haben. Da die Wurzelkanäle sich den Wurzelformen anpassen, also auch stark gekrümmt oder winkelig abgebogen verlaufen, ist es er-

klürlich, daß mit dem zur Verfügung stehenden Instrumentarium die Pulpa nicht restlos entfernt werden kann.

Zu den Anomalien gehören ferner Ausbuchtungen der Wurzelkanäle, sogenannte Lakunen, deren Ränder von unserem Instrumentarium nie berührt werden. Oft bleiben beträchtliche Pulpateile zurück, weil überzählige Wurzeln nicht erkannt wurden.

Endlich spielen Verkalkungen, als Ursache von Mißerfolgen eine große Rolle. Es kann sich dabei um Reizdentin, Dentikel oder Verkalkungen in toto handeln. Alle Arten bilden starke Hindernisse für die Behandlung der Wurzelkanäle, ja schließen eine solche überhaupt anatomisch bedingt vielfach aus.

Bei Milchzähnen spielen anatomische Verhältnisse nur eine untergeordnete, physiologische Verhältnisse dagegen die Hauptrolle, denn Form und Masse der Pulpa bei Milchzähnen gleichen im Allgemeinen derjenigen der bleibenden Zähne. Im Verhältnis zur Zahnmasse ist die Pulpa nur bedeutend größer. Anomalien sowohl nach Wurzelzahl wie -form sind relativ selten, Verkalkungen usw. fast ganz auszuschließen. Dagegen verdienen die Resorptionsvorgänge besondere Aufmerksamkeit. Ihr Beginn, ihr Fortschreiten und ihre Ausdehnung in den einzelnen Altern muß genau bekannt sein und beachtet werden. Denn da die Resorption der Milchzahnwurzeln nicht am Apex, sondern in halber bis zwei Drittel Wurzelhöhe beginnt, besteht an dieser Stelle sehr bald eine Verbindung des Kanals mit dem umliegenden Gewebe. Bei der Anwendung von Instrumenten und Medikamenten ist daher besonders vorsichtig zu verfahren und an dieser Stelle nicht durchzustößen. Hat die Resorption den Wurzelkanal schon eröffnet, verbietet sich eine Wurzelbehandlung natürlich von selbst. Wird gegen diese Grundbegriffe verstoßen, so kann leicht aus der beabsichtigten Erhaltung des Milchzahnes ein Verlust werden. Bei jugendlich bleibenden Zähnen liegen die Dinge ähnlich, nur daß der Aufbau des Zahnes noch nicht beendet ist. Infolgedessen ist, genau wie bei den Milchzähnen größte Sorgfalt und Vorsicht am Platz. Bestehen Zweifel über den Umfang der Resorption oder des Wurzelwachstums, so ist eine Röntgenaufnahme von Nöten, durch die dann möglicherweise Unheil und

Mißerfolge vermieden werden. Die erläuterten Schwierigkeiten treten schon bei gut zugänglichen Zähnen auf, zu denen ich den ersten Molaren gerechnet habe. Viel schwieriger wird die Behandlung bei den zweiten und dritten Molaren. Wenn bei dem zweiten Molaren das Pulpencavum noch so weit eröffnet ist, und die Wurzeleingänge noch so gut sichtbar sind, treten bei der Exstirpation der Pulpa doch Schwierigkeiten rein technischer Art auf. Selten findet man bei den Molaren gerade Wurzeln mit entsprechend verlaufenden Kanälen. Gerade hier sind die anatomischen Verhältnisse besonders ungünstig. Bei dem zweiten Molaren variiert schon außerdem sehr häufig die Anzahl der Wurzelkanäle. Erst recht bei dem dritten Molaren. Oft findet man nur einen Wurzelkanal. Treten nun noch Stellungsanomalien hinzu, oder sind besonders enge Mundverhältnisse vorhanden, so sind dies Schwierigkeiten, die überhaupt nicht überwunden werden können. Man suchte ihnen durch Verzicht auf totale Exstirpation der Pulpa zu begegnen und glaubte in der Amputation eine gleichwertige Methode gefunden zu haben.

Es ist das große Verdienst von Adolf Witzel, der die Behandlung einer erkrankten Pulpa mit antiseptischen Mitteln einführte. Bei entzündeten Pulpen nahm er unter streng antiseptischen Grundsätzen deren Kronen fort, nachdem dieselben mit arseniger Säure abgeätzt waren. Witzel glaubte, daß bei der Abtötung der Pulpa nur der Kronenteil betroffen sei und daß nach Wegnahme des entzündeten Teiles die Wurzelstümpfe weiterleben würden. Diese Ansicht Witzels erwies sich als irrig. Die Pulpenreste starben zusammen mit der Kronenpulpa ab und wurden in den meisten Fällen atrophisch. Die Indikation für die Anwendung der Pulpaamputation war zunächst viel zu weit gezogen. Bald erkannte man, daß sie sich nach dem Entzündungsgrad der Pulpa richten muß und nur bei folgenden Erkrankungen mit sicherem Erfolg angewandt werden kann:

1. Bei akzidentell eröffneter, also nicht entzündeter Pulpa.
2. Bei bestehender Hyperämie der Pulpa.
3. Bei Pulpitis superficialis.

Zweifelhaft ist der Erfolg einer Pulpaamputation bei Pulpitis partialis. Unmöglich kann die Amputationsmethode aber bei total entzündeten Pulpen angewandt werden. Denn eine Menge von Krankheitskeimen enthält jede total erkrankte Pulpa, die auch schon zum Teil in die Dentinkanälchen eingedrungen sind. Wenn auch bei einer mit Arsen abgetöteten Pulpa eine gewisse Sterilität erreicht wird, so ist damit nicht gesagt, daß die Mikroorganismen in den entfernteren Schlupfwinkeln auch abgetötet sind. Man weiß auch nicht ob die Wurzelhaut bereits geschädigt ist. Die Gefahr einer Reinfektion von dieser Seite aus bleibt also immer bestehen. Bei allen anderen Entzündungserrscheinungen der Pulpa, wie pulpitis purulenta, pulpitis ulcerosa, chronika und gangränosa oder auch akuten und chronischen Periodontitiden darf eine Amputation nie vorgenommen werden. Vor jeder Wurzelbehandlung muß also eine genaue Diagnose gestellt sein.

Soll nun eine Pulpaamputation durchgeführt werden, so ist die Technik doch recht schwierig, denn absolute Sterilität bei der Pulpaamputation ist nach erfolgter Arseneinlage der wichtigste Punkt. Vor Eröffnung des Pulpadaches müssen daher sämtliche kariöse Massen entfernt werden. Die Wurzelkanaleingänge müssen übersichtlich sein, der Zutritt von Speichel muß unter allen Umständen verhindert werden. Daß nur sterile Instrumente verwandt werden dürfen, ist selbstverständlich. — Ist die Pulpaamputation auch unter strenger Beobachtung obiger Punkte durchgeführt worden, so kann ein Dauererfolg immer noch dadurch vereitelt werden, daß infolge Mumifikation eine Schrumpfung der Pulpa eintritt; dadurch leere Räume im Wurzelkanal entstehen und somit die Gefahr einer Reinfektion gegeben ist. Aus dieser Unsicherheit zusammen mit Indikation und schwieriger Technik folgt, daß auf Wurzelbehandlung mit totaler Exstirpation nicht verzichtet werden kann. Sie kommt überall da in Frage, wo die Erkrankung bereits auf die Wurzelpulpa übergegangen ist, wo eine absolute Trockenheit und damit Sterilität der Kavität und des Kavums nicht erreicht werden kann und endlich, wo es an der nötigen Übersicht fehlt. Die Folgerung aus dieser Erkenntnis — das heißt der Unentbehrlichkeit der

Exstirpationsmethode — konnte nur die sein, daß einerseits das Instrumentarium verbessert und vervollständigt wurde, um so allen anatomisch bedingten Schwierigkeiten, die im vorhergehenden ausführlich erörtert wurden, Herr zu werden. Zweitens suchte man wirksamere Medikamente, sei es zur Desinfektion und Sterilisation des Arbeitsfeldes oder sei es zur Wurzelfüllung.

ad 1. Haben wir enge Eingänge, so kommen wir mit Eingangserweiterern zum gewünschten Erfolg. Enge Kanäle lassen sich mit Rattenschwanzfeilen sehr gut erweitern. Nervkanalraspeln führen bei ungängigen Kanälen zum Ziel. Gebogene Kanäle, auch wenn sie eng sind, lassen sich mit dem Aufreiber nach Walkhoff sehr gut erweitern. Sind die Kanäle zum Teil verkalkt, so stehen uns Beutelrockbohrer zur Verfügung. Vor der maschinellen Anwendung dieser Erweiterungsinstrumente, vor allen Dingen der Beutelrockbohrer, muß sehr gewarnt werden. Wenn sie auch im ersten Drittel des Wurzelkanals noch kein Unheil anrichten, so ist die Gefahr einer Perforation um so größer, je tiefer man vordringt. Ein Hilfsmittel und eine Kontrolle bietet uns jederzeit die Röntgenaufnahme.

Bei einfachen Pulpitiden kann damit gerechnet werden, daß die Infektion sich auf den Kanalinhalt und auf die den Kanal angrenzende Dentinschicht erstreckt. Anders liegen die Dinge bei Gangrän, Pulpitis purulenta, chronica und zum Teil auch ulcerosa. Hier sind Bakterien, Eiter- und Fäulniserreger schon weit in die Zahnbeinkanälchen vorgedrungen. Ihre Vernichtung wird neben der Reinigung der Wurzelkanäle Hauptziel. Zunächst sind die zerfallenen Massen aus dem Wurzelkanal zu entfernen, denn ein gründliches mechanisches Säubern ist Voraussetzung für eine desinfizierende Einlage. Vielfach werden Säuren, wie Schwefelsäure, Salzsäure oder auch Königswasser mit anschließender Neutralisation verwandt, um eine schnellere Reinigung zu erzielen. Doch ist größte Vorsicht geboten, da gangränöse Wurzelkanäle meistens ein großes Foramen besitzen und dadurch im periapikalen Gewebe große Schädigungen hervorgerufen werden können. Hinsichtlich der desinfizierenden Einlagen unterscheidet man zwischen Kontakt-

desinfektion und Desinfektion mit Fernwirkung, also ein Desinfektionsmittel, welches vergast und so in die entferntesten Schlupfwinkel vordringen kann und ein Desinfektionsmittel, welches nur in allernächster Umgebung wirksam ist.

ad 2. Ist der Wurzelkanal nun bis zum foramen apikale durchgängig, frei von allen fäulnisfähigen Stoffen, steril und trocken (dies ist möglichst von einem zu füllenden Wurzelkanal zu verlangen), dann kann man daran denken, ihn abzufüllen. Aber es ist erforderlich auf eine Verbesserung der Wurzelfüllmittel bedacht zu sein. Was fordert man heute von einem Wurzelfüllmaterial? Miller hat eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die von Meyerhofer, Knefchaurek und Albrecht erweitert wurden. Sieben Grundforderungen muß nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ein einwandfreies Wurzelfüllungsmaterial erfüllen:

1. Formbeständigkeit
2. Desinfizierende Wirkung
3. Dauerdesinfiziens
4. Keine Reizung des periapikalen Gewebes
5. Leicht verarbeitbar, d. h. leicht einführbar und entfernbar
6. Keine Verfärbung des Zahnes
7. Röntgenologisch positiv.

Bei einzelnen Wurzelfüllmaterialien wird größter Wert auf Enthaltung von Desinfizenzien gelegt. Andere zielen auf einen sicheren Abschluß des foramen apikale hin. Pasten, wie auch Zemente werden in Kombination mit Points angewandt. Bei Pasten in Verbindung mit einem Guttaperchastift will man erreichen, daß die auf jeden Fall den letzten Teil des Wurzelkanals ausfüllt und sich eng an die Kanalwände schmiegt. Bei Verwendung von Zement und Elfenbeinstift soll auf jeden Fall ein sicherer Abschluß des foramen erzielt werden. In letzter Zeit hat man zum Abfüllen der Wurzelkanäle das Silber verwandt. Der Schweizer Botaniker von Nägeli befaßte sich als erster mit der keimtötenden Wirkung mancher Schmermetalle, darunter auch Silber. Zuerst stellte er Versuche mit Kupferstücken an. Er wies nach, daß in einem wassergefüllten Gefäß, welches Süßwasseralgen enthielt, in der Umgebung der

# **Wurzelfüllmaterialien:**

| Nach Pulpitis:                  |        |                                                |        | Nach Gangrän:                   |        |                                           |        |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| im Frontzahn-<br>bereich        | Anzahl | im Prämolaren-<br>und Molaren-<br>bereich      | Anzahl | im Frontzahn-<br>bereich        | Anzahl | im Prämolaren-<br>und Molaren-<br>bereich | Anzahl |
| Walkhoff Nr. 1                  | 5      | Walkhoff Nr. 1                                 | 6      | Walkhoff Nr. 1                  | 3      | Walkhoff Nr. 1                            | 6      |
| Walkhoff Nr. 6                  | 1      | Walkhoff Nr. 6                                 | 1      | Walkhoff Nr. 6                  | 3      | Walkhoff Nr. 6                            | 1      |
| Trikresolform-<br>Paste         | 2      | Trikresolform-<br>Paste                        | 2      | Trikresolform-<br>Paste         | 1      | Trikresolform-<br>Paste                   | 3      |
|                                 |        | Trikresolform-<br>Paste + Gttp.                | 2      | Trikresolform-<br>Paste + Gttp. | 2      | Trikresolform-<br>Paste + Gttp.           | 2      |
| Jodof. Zinkox.<br>Nelkenöl      | 1      | Jodof. Zinkox.<br>Nelkenöl                     | 1      | Jodof. Zinkox.<br>Nelkenöl      | 1      | Jodof. Zinkox.<br>Nelkenöl                | 1      |
| Jodoform-P.<br>+ Guttap.        | 1      | Jodoform-P.<br>+ Guttap.                       | 1      | Jodoform-P.<br>+ Guttap.        | 1      | Jodoform-P.<br>+ Guttap.                  | 1      |
| Jodof. Zement<br>+ Elfenbeinst. | 1      |                                                |        | Jodof. Zement<br>+ Elfenbeinst. | 1      | Jodof. Zement<br>+ Elfenbeinst.           | 1      |
|                                 |        | Jodof., Thymol,<br>Zinkox.,<br>Chlorph. als P. | 1      |                                 |        |                                           |        |
|                                 |        | Tym. Eug.<br>Zinkox.                           | 1      |                                 |        | Thym. Eug.<br>Zinkox.                     | 1      |
| Gysische Triop.                 | 1      |                                                |        | Gysische Triop.                 | 2      | Gysische Triop.                           | 4      |
| Chlorph.-P.                     | 1      | Chlorph.-P.                                    | 1      | Chloroph. + Jdf.                | 1      |                                           |        |
| Chlorof. + Gttp.                | 1      | Chlorof. + Gttp.                               | 1      | Chlorof. + Gttp.                | 1      |                                           |        |
| Silberpaste                     | 1      | Silberpaste                                    | 1      |                                 |        |                                           |        |
| Silberzement<br>+ Silberstift   | 2      | Silberzement<br>+ Silberstift                  | 2      | Silberzement<br>+ Silberstift   | 4      | Silberzement<br>+ Silberstift             | 3      |
|                                 |        | Albrechtsche P.                                | 1      |                                 |        | Albrechtsche P.                           | 1      |

### Apicale Reizerscheinungen:

| In wieviel % der Fälle:            | Nach welcher Zeit:                   | Von welcher Dauer:                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3—5 %                              | am gleich. od. nächst. Tag           | 2—4 Tage                                             |
| kann nicht genau angegeben werden. |                                      |                                                      |
| 2—10 %                             | am nächsten bis 5. Tag               | 2—14 Tage                                            |
| Nur wenn durchgestopft war         | am nächsten Tag                      | hängt von der Menge des durchgestopften Materials ab |
|                                    | 2—5 Tagen                            | 2—10 Tage                                            |
| 15 %                               | kurz nach der Füllung                | 2 Tage                                               |
| 15 %                               | am nächsten Tag                      | 2—3 Tage                                             |
| 5 %                                | am gleich. od. nächst. Tag           | Stunden — Tage                                       |
| 5—25 %                             | nach 1—2 Tagen                       | 2—3 Tage                                             |
| 2—3 %                              | am nächsten Tag                      | bis zu 5 Tagen                                       |
| kann nicht genau angegeben werden. |                                      |                                                      |
| 20—25 %                            | am gl. bzw. nächst. Tag              | 2—3 Tage                                             |
| 3—4 %                              | sofort oder auch erst am 2. — 5. Tag | 2—10 Tage                                            |
| 5 %                                | am gleich. od. nächst. Tag           | Stunden — Tage                                       |

Kupferstücke eine Entwicklungshemmung der Algen eintrat. Von Nägeli nannte dies Kraft „Olygodynamische Wirkung“. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurde auf ärztlichem Gebiet versucht, die keimtötende Wirkung des Silbers zu Heilzwecken zu verwenden. Credé-Dresden machte zuerst Versuche mit Silber imprägnierten Verbandsmaterialien. Erst später fand das Silber in der Zahnheilkunde als Wurzelfüllmaterial Verwendung. Es wird jetzt sowohl als massiver Stift, wie auch in Pulverform verwendet. Weiter finden Silbermanganitstifte und Edelmetall-Wurzelstifte nach Dr. Oppenheim Verwendung.

Welche Wurzelfüllmaterialien sind nun am gebräuchlichsten, wie ist ihre Zusammensetzung, welchen Anforderungen genügen sie, bzw. welche Mängel haben sie? Durch eine Rundfrage an größere zahnärztliche Institute erhielt ich die gebräuchlichsten Wurzelfüllmaterialien, angeordnet nach Pulpitiden und Gangrän. Nachstehende Tabelle gibt uns einen Überblick. In den ersten Spalten sind die Präparate aufgeführt, die nach Pulpitiden im Frontzahnbereich, und dem der Prämolaren und Molaren, zum Ausfüllen des Pulpenraumes angewandt werden. Daran anschließend Wurzelfüllmaterialien nach Gangrän. Der letzte Teil der Tabelle gibt uns Aufschluß über die apikalen Reizerscheinungen der einzelnen Materialien, und zwar in wieviel Prozent der Fälle sie auftraten, nach welcher Zeit und welcher Dauer diese Erscheinungen waren.

Die gebräuchlichsten Füllmaterialien sind:

1. pastenförmige
2. feste (Zemente)
3. beide in Verbindung mit Points.

Zu den pastenförmigen Füllmaterialien gehören:

- a) Walkhoffs Jodoformpaste Nr. 1
- b) Walkhoffs Jodoformpaste Nr. 6
- c) Jodoform-Nelkenöl-Zinkoxyd-Paste
- d) Jodoform-Thymol-Chlorphenol-Zinkoxyd-Paste
- e) Thymol-Eugenol-Zinkoxyd-Paste
- f) Chlorphenol-Paste

- g) Trikrefol-Formalin-Paste
- h) Gyfische Triopaste
- i) Silberpasten.

Zu den festen Füllmaterialien zählen:

- a) Jodoformzement
- b) Silberzement
- c) Guttapercha u. Chloroform
- d) Albrechtsche Wurzelpaste.

Die pastenförmigen, wie auch die festen Füllungen, werden zum Teil mit Points (Guttaperchaftiften, Elfenbeinstiften oder Silberstiften) kombiniert.

Die Pasten sind heute das am meisten verwandte Wurzelfüllmaterial. An der Spitze steht die Walkoffische Jodoformpaste, deren Bestandteile Jodoform, Chlorphenol, Campher und Menthol bzw. Thymol sind.

Jodoform gleich Trijodmethan ( $\text{CHJ}_3$ ) ist eine dem Chloroform entsprechende Verbindung. Es besteht aus gelben, glänzenden Kristallen, die sich fettig anfühlen. Hergestellt wird es aus einem Gemisch von Alkohol, Jod und Kalilauge. Jodoform löst sich erst in 5000 Teilen Wasser, aber sehr gut in Alkohol und fetten Ölen. In günstigster Weise beeinflusst das Jodoform die Regeneration des Gewebes und veranlaßt eine schnelle Heilung. Es vermindert die Sekretwirkung von Wunden bis zur Austrocknung. Mikulicz führte das Jodoform in die Chirurgie ein, und zwar als Desinfiziens. Jedoch hat sich gezeigt, daß dem Jodoform nur eine geringe antibakterielle Wirkung anhaftet. Deshalb findet es in der allgemeinen Chirurgie wenig Verwendung. Auf größere Wundflächen gebracht, wirkt es giftig, denn von diesen wird es besonders leicht resorbiert. Diese Vergiftungen kommen wahrscheinlich dadurch zustande, daß das Jodoform — obwohl im Wasser unlöslich — durch das Wundsekret in organische Jodverbindungen umgesetzt wird, die dann aufgenommen werden können. Eine die Jodoformanwendung zuweilen sehr beeinträchtigende Nebenwirkung ist das Auftreten von

Hautexanthenen: Ekzeme oder Erythemen an der Anwendungsstelle oder auch an entfernten Körperteilen.

Die guten Eigenschaften des Jodoforms aber zeigen sich gerade bei Verwendung in geschlossenen Höhlen. Es verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur und darauf ist wohl ein Teil seiner Heilwirkung zurückzuführen. Ferner beruht die Wirkung des Jodoforms auf seinem großen Gehalt an Jod (96,7%), welches sich abspaltet. Unter Luftabschluß kommt die Baktericidität des Jodoforms voll zur Geltung. Nach Heile entsteht dabei Dijodacetylen, welches in bezug auf Baktericidität auch die stärksten Antiseptika, wie Sublimat übertrifft. Nach Binz sollen diese Wirkungen durch Abspaltungen von Jod und Sauerstoff zustandekommen, wenn es mit lebendem Gewebe in Berührung kommt. Büchner glaubt an eine auftretende Immunität des Gewebes gegen Infektionen.

Wegen seines stechenden Geruches wird mancherseits Jodoform abgelehnt. Doch gibt es viele Ersatzpräparate, unter anderen das Aristol (Dimethyldijodid), ein aus Thymol und Jod dargestelltes Pulver, welches als geruchloser Ersatz des Jodoforms dient. Jedoch spaltet es nur 46% Jod ab.

Chlorphenol (phenolum chloratum  $C_6H_4ClOH$ ) ist ein Desinfektionsmittel der aromatischen Reihe. Es besteht aus farblosen Kristallen, die sich schwer in Wasser aber leicht in Alkohol lösen. Dieses Präparat ist dadurch entstanden, daß im Phenol ein H durch ein Cl ersetzt worden ist. Örtlich wirkt kristalinisches oder flüssiges Phenol stark ätzend und nekrotisierend auf das Epithel der Mundschleimhaut, die Epidermis der Oberhaut und Finger. Dieses beruht auf der Eigenschaft als allgemeines Protoplasmagift und der Fähigkeit, Eiweiß selbst noch in großen Verdünnungen zu fällen. Chlorphenol diffundiert langsam in benachbartes Gewebe und übt dort seine antiseptische Wirkung aus.

Campher ( $C_{10}H_{16}O$ ) stellt farblose Prismen von charakteristischem Geruch dar. Chemisch steht er den Terpenen sehr nahe und wird aus diesen synthetisch dargestellt, er ist ein Keton derselben. Campher ist ein sehr flüchtiger Körper. Im Wasser löst er sich nur

wenig (erst in 1000 Teilen), viel leichter wird er von Alkohol, Äther und fetten Ölen aufgenommen. Verreibt man Campher mit Phenol, Thymol, Menthol oder Reforcin und manchen anderen festen organischen Verbindungen, so werden die Mischungen flüchtig. Chlumsky empfahl schon im vorigen Jahrhundert eine Kombination von Campher und Phenol. Er stellte eine eigene Mischung von 30 Teilen Karbolsäure, 40 Teilen Campher und 10 Teilen Alkohol dar. In Substanz findet Campher Anwendung als ableitendes Mittel. Innerlich ist er in kleineren Gaben ein anregendes Mittel zur Anregung des Herzens und der Atmung.

Menthol (Methylisopropylhexahydrophenol  $C_{10}H_{19}OH$ ) ist der Hauptbestandteil des japanischen Pfefferminzöls. Im Wasser ist es nur wenig, dagegen in Alkohol, Äther und Chloroform leicht löslich. Menthol ist ein Alkohol des Hexahydrocymols und somit dem Thymol, das ein Alkohol des Cymols ist, nahe verwandt. Es wirkt antiseptisch und anästhesierend.

Thymol ist ein starkes Desinfizienz. Es gehört zu der Gruppe der Phenole und ist ein Methylisopropylphenol. In Wasser löst sich Thymol sehr langsam und wenig. Thymol ist dem Phenol sehr ähnlich, wirkt aber örtlich weniger reizend und ist auch resorptiv fast zehnmal weniger giftig, trotzdem jedoch antiseptisch diesem überlegen. In Substanz oder in hoher Konzentration mit lebendem Gewebe in Berührung gebracht, reizt es und verursacht Schmerzen.

Eugenol (Gewürznelkenöl)  $C_6H_5C_3H_5OCH_3OH$  gehört ebenfalls zu der Gruppe der Phenole. Zu 70—85% befindet es sich im Gewürznelkenöl. Eugenol wirkt lokalanästhesierend, zugleich aber auch reizend und ätzend.

Trikresol ist das Gemisch der drei isomeren Kresole, also von Ortho-, Meta- und Parakresol. Die Kresole haben starke bakterienvernichtende Wirkung. Auf Spaltpilze wirken sie stärker als Phenole, am stärksten das Metakresol, das gleichzeitig am wenigsten giftig ist. Das Trikresol löst sich im Verhältnis von 2,2—2,5% in Wasser. In der Zahnheilkunde hat es dadurch an Bedeutung gewonnen, daß es von Buckley als Vehikel für Formaldehyd benutzt wurde. Die stark reizende Wirkung des Formalins kommt

durch den Zusatz von Trikresol weniger zur Geltung.

Formalin ist die 35—40%ige Lösung des Formaldehyds ( $\text{HCOH}$ ) in Wasser. Formaldehyd ist ein starkes Desinfizienz, welches u. a. Milzbrandbazillen noch in einer Verdünnung von 1:20000, Milzbrandsporen in einer Verdünnung von 1:1000 innerhalb einer Stunde tötet. Er ist ein äußerst reaktionsfähiger Körper, der mit Eiweißstoffen und Geweben aller Art Verbindungen eingeht und dieselben in eine harte Masse verwandelt (mumifiziert). Auf eine freiliegende noch lebende Pulpa darf Formalin nicht gebracht werden, da hierdurch starke Schmerzen auftreten. Formalin verursacht Nekrosen.

Trioxymethylen ist der Paraformaldehyd des Handels, ein Gemisch von Polyoxymethylen. Das wirkliche Trioxymethylen  $(\text{CH}_2\text{O})_3$  entsteht durch Polymerisation von gasförmigem Formaldehyd. Es schmilzt bei  $63^\circ$  und ist flüchtig.

Kreolin ist ein Desinfektionsmittel, welches im wesentlichen aus rohem Kresol mit geringem Zusatz von Harzseifen besteht, deshalb löst es sich im Wasser nicht klar, sondern ergibt Emulsionen. Kresol entsteht aus dem Phenol. Im bakteriziden und toxischen Verhalten ist es der Karbolsäure ähnlich. Die Haut wird aber weniger stark geätzt und nekrotisiert.

Dieses sind die einzelnen Medikamente der Wurzelfüllpasten. Welchen Anforderungen genügen nun die einzelnen Pasten, bzw. welche Mängel weisen sie auf?

Walkhoff'sche Jodoformpaste Nr. 1 und 6:

Walkhoff betrachtet das Problem der Wurzelfüllung von zwei Seiten aus. Er sagt, daß es unmöglich ist, mit den heute gebräuchlichen anorganischen Substanzen oder solchen, die auf chemischem Wege innerhalb kurzer Zeit erhärten, einen unbedingten Abschluß des Foramen apicale zu erreichen. Entweder geht die Füllung über das Foramen hinaus oder sie reicht gar nicht bis dorthin. Im ersteren Falle bleibt das hindurchgestoßene Material ein dauernder Fremdkörper für das umgebende Gewebe, so daß also eine bleibende Reizung des apicalen Gewebes und seine seröse Durchtränkung stattfindet. Wird nun aber der Wurzelkanal nicht bis zum Foramen

apicale gefüllt, dann kann nicht von einem hermetischen Abschluß gesprochen werden. Der nicht ausgefüllte Teil ist und bleibt eine Brutstätte der Bakterien. Diesen ist es jederzeit möglich, durch das offene Foramen apicale sich im Körper weiter zu verbreiten.

Um diese beiden Hauptmängel zu beseitigen, mußte es für Walkhoff ein Wurzelfüllmaterial geben, welches bei Kontakt mit lebendem Gewebe keine oder nur sehr geringe Reizererscheinungen hervorruft, oder welches bei nicht vollständigem Ausfüllen des Kanals keine Rezidive aufkommen läßt. Ein Material von möglichst anhaltender antiseptischer Wirkung, nicht nur mit Kontakt- sondern auch mit möglichst großer Fernwirkung, kann nur die gewünschten Erfolge bringen. Darauf ist vor allen Dingen bei einer Gangrän wohl zu achten.

Um kurz noch auf den Kontakt des Wurzelfüllmaterials zurück zu kommen, darf durch den dauernden Druck, den das Füllmaterial ja bei Überschuß auf die Wurzelhaut und die umgebenden Gewebe hervorruft, keine anhaltende Reizung verursacht werden, sondern das betreffende Gewebe muß in der Lage sein, diesen Überschuß durch Resorption zu vernichten und den Rest im Kontakt vertragen zu können.

Bei der Walkhoff'schen Wurzelfüllpaste finden wir dieselben Medikamente wieder, die zur allgemeinen Vorbehandlung der Wurzelkanäle bei einfachen Pulpitiden wie auch bei Gangrän angewandt werden. Walkhoff geht dabei vom Chlorphenol aus, welches, wie schon erwähnt wurde, ein gutes Desinfektionsmittel ist. Wegen seiner ätzenden Eigenschaft fügt Walkhoff noch Kampfer und Menthol hinzu. Letzteres wirkt besonders stark desinfizierend auf die Staphylokokken und Saprophyten. Außerdem wirkt es lokalanästhetisch. Diese eigens von Walkhoff ausprobierte und in einem bestimmten Verhältnis gemischte Chlorphenolkampfermenthol-Lösung durchdringt leicht die Zahnsubstanzen, da sie keine Eiweißkoagulation hervorruft. Diese drei Medikamente: Chlorphenol, Kampfer und Menthol bringt Walkhoff zusammen, von denen er sagt: „Wir besitzen in diesem Präparat nunmehr ein völlig reizloses und entzündungswidriges, die Gewebe nicht schädigendes Mittel, voraus-

gesetzt, daß v o l l k o m m e n gefättigte Lösungen verwandt werden“.

Wir haben es also mit einer schnell einsetzenden wie auch lang dauernden Desinfizierung zu tun, die es möglich macht, an alle Organismen, auch in den entferntesten Schlupfwinkeln heranzukommen und sie dann vernichtet, denn in einer antiseptischen Daueratmosphäre ist ein Leben der Mikroorganismen nicht möglich.

Nun wird die Wurzelbehandlung einmal durch die entzündete Pulpa, das andere Mal durch die völlig zerstörte, tote Pulpa in zwei sich deutlich unterscheidende Abschnitte getrennt. Bei den Pulpitisformen gelingt es, durch die Devitalisation verhältnismäßig einen sterilen Wurzelkanal zu schaffen und dadurch Schädigungen des periapicalen Gewebes zu verhüten. Mehr oder minder ist es aber bei gangränösen Zähnen geschädigt. Deshalb gibt es auch zwei verschiedene Behandlungsarten. Bei der Behandlung rein entzündeter Pulpen beschränkt sich die Zuführung der Chlorphenolkampfermenthol(Ch.-K.-M.)-Lösung auf einige wenige Tropfen während der Exstirpation und der eventuellen Erweiterung der Kanäle. Meistens kann dann nach einer einmaligen Ch-K-M-Einlage der Wurzelkanal abgefüllt werden. Bei eitrigen oder gangränösen Pulpen dagegen muß man ausgiebigen Gebrauch von der Ch-K-M-Lösung machen. Die Wurzelkanäle müssen mehrmals im Abstand von einigen Tagen mit Ch-K-M. beschickt werden. Erst durch diesen öfteren Wechsel läßt sich eine Sterilität des Wurzelkanals erreichen, der dann die Wurzelfüllung folgen kann.

Nach dieser Vorbehandlung geht W a l k h o f f nun zur Wurzelfüllung über. Er verlangt von ihr, daß sie ein umfangreiches, antiseptisches Depot bildet von möglichst langer Dauer, welches die noch vorhandenen oder hinzutretenden Mikroorganismen tötet. Dann müssen aber auch Bestandteile vorhanden sein, um die noch etwa bestehende Sekretion der Wundfläche am Apex bis zu ihrem Stillstand günstig zu beeinflussen. W a l k h o f f setzt der Ch-K-Lösung noch reines Jodoform hinzu, welches sich gut zu einer Paste verarbeiten läßt. Es wird also ein Material in den Wurzelkanal gebracht, welches zunächst die Sekretion hemmt bzw. zum Stillstand

bringt und unter dessen Einfluß sich dann ein kräftiges Granulationsgewebe bildet. Zuviel durchgestopftes Material wird sehr schnell resorbiert. Die dabei auftretende leichte Druckempfindlichkeit des Zahnes läßt sehr bald nach, allerdings ist es ein Nachteil der PASTE. Eine Reinfektion braucht nicht befürchtet zu werden, denn die PASTE enthält ein Dauerdesinfizienz.

Bei engen Kanälen setzt W a l k h o f f der oben beschriebenen Jodoformpaste Nr. 1 noch Menthol-Thymol hinzu. Menthol, vor allem Thymol, ist ein ausgesprochenes Dauerantiseptikum, deshalb bei Gangrän und bei engen, schwer zugänglichen Kanälen ein gutes Mittel zur Desinfektion.

Vielfach wird die Verfärbung des Zahnes durch Jodoform gerügt. Dazu schreibt W a l k h o f f in der zahnärztlichen Rundschau: „Wenn nach gemachter Wurzelfüllung die Kronenhöhle und die Kronenpulpakammer mit absolutem Alkohol auswischt, — nicht wegen der Löslichkeit des Jodoforms überschwemmt — und noch einmal mit einem größeren Rosenbohrer über die feitlichen Wände der ganzen Höhle geht, um jede Spur von Jodoform von denselben zu entfernen, so ist eine Verfärbung kaum denkbar. Nach dem Ausblasen der Höhle müssen die Wurzelkanäle als gelbe Punkte auf dem Boden der Höhle liegen. Erst wenn man das erreicht hat, kann mit Zement oder Silberzinnfolie abgeschlossen werden“.

Sämtliche pastenförmige Wurzelfüllmaterialien sind leicht in den Wurzelkanal einzuführen und, falls es notwendig erscheint, schnell und leicht wieder zu entfernen. Wie ist es nun mit der Formbeständigkeit der Walkhoff'schen Pasten? Diese Forderung wird nicht ganz erfüllt; es ist aber auch nicht so sehr ein Nachteil, denn die Pasten enthalten Dauerdesinfizientien, die eine Reinfektion verhüten. Im Röntgenbilde lassen sich die Walkhoff'schen Pasten gut nachweisen.

Wie ist es mit den anderen Pasten als Wurzelfüllmaterial? Nach Tabelle 2 enthalten die nächsten Materialien als hauptsächlichstes Mittel Jodoform, dessen Wirkung der Wiederholung halber nicht mehr besprochen werden soll. Auf der einen Seite wird es noch mit Nelkenöl und Zinkoxyd als Basis vermischt. Nelkenöl besitzt

zwar lokalanästhetische Eigenschaft, wirkt aber ätzend und reizend. Die Reizung des periapicalen Gewebes ist also möglich.

Die nächste Wurzelfüllpaste hat fast dieselbe Zusammensetzung wie die Walkhoff'sche Paste Nr. 6, nur das hier das Menthol fehlt und Zinkoxyd als Basis verwandt ist. Deshalb braucht nicht näher darauf eingegangen zu werden.

Der Thymol-Eugenol-Zinkoxyd-Paste fehlt ein Mittel, welches die Wundfläche am Apex günstig beeinflusst. Es besteht die Gefahr einer weiteren Sekretion und Reizung des apicalen Gewebes. Dasselbe gilt auch von der Chlorphenolpaste, wenn auch hier infolge des Hauptbestandteiles eine apicale Reizung nicht so sehr zu befürchten ist. Ein Dauerdesinfizienz fehlt aber.

Die nun in der Tabelle folgende Trikresol-Formalin-Paste wird auch sehr viel angewandt. Im Trikresol haben wir ein starkes Desinfizienz, welches Buckley als Vehikel für Formalin benutzte. Obwohl Formalin Eiweiß koaguliert, die Sekretion hemmt, und ein gasförmiges Antiseptikum darstellt, so muß man doch in der Anwendung der Trikresol-Formalin-Paste vorsichtig sein, denn in sehr vielen Fällen treten periodontitische Schmerzen auf.

Außer der Walkhoff'schen Wurzelfüllpaste konnte ich die anderen Wurzelfüllmaterialien kurz behandeln und brauchte nur auf diesen oder jenen Mangel hinzuweisen. Wie die Walkhoff'sche Methode eine besondere Vorbereitung und Behandlung des Wurzelkanals verlangt, und ich auch deshalb näher darauf eingehen mußte, so ist es auch erforderlich, daß ich diesen Weg bei der Gyfi'schen Methode beschreite. Nach Professor G o f f u n g ist bei der Pulpaexstirpation folgendes zu beachten:

Das Abreißen der getöteten Pulpa darf nicht außerhalb des Foramen apicale erfolgen, wegen der Infektionsgefahr des Periodontalgewebes. Es darf keine Rißwunde entstehen, sondern es muß vielmehr eine glatte Trennung des toten Pulpenteiles von dem noch lebenden stattfinden, also eine Art tiefe Amputation. Dieselbe soll in drei Sitzungen stattfinden. Vor der Kobalteinlage soll mittels dem Walkhoff'schen Chlorphenol-Menthol ein Ätzschorf auf der freigelegten Pulpa erzeugt werden bei einer Liegedauer von 2—3

Minuten. In der nächsten Sitzung soll die Pulpakammer ausgebohrt werden und ein kleiner Tampon mit Triopaste soll 8—10 Tage liegen bleiben. In der dritten Sitzung soll die Extirpation der Pulpa erfolgen. Hierauf folgt eine mechanische Reinigung des Wurzelkanals und evtl. Wurzelfüllung mittels eines Lentulo. Niemals darf die Triopaste mit lebendem Gewebe in Berührung kommen, dies ist eine unerlässliche Regel bei ihrer Verwendung. Die Gefahr des Durchstopfens ist aber bei Verwendung von Guttaperchaspitzen sehr groß, deshalb sollen nur schräg abgefehlte und vor allen Dingen sehr dünne Guttaperchapoints verwandt werden. Dadurch wird vermieden, eine Stempelwirkung im Kanal auszuüben und die antiseptische Wirkung der Paste herabzusetzen. So weit

**G o f f u n g.**

Die Triopaste nach Gyfi hat folgende Zusammensetzung:

Trikrefoli 2,5

Trioxymeth. 5,0

Kreolini 5,0

Zinkoxyd 15,0

Glycerin 1,0.

Nach M i c h a e l i s besitzt sie große Diffusionskraft, ist reizlos und farbbeständig. Das Dauerdesinfizenz ist im Trioxymethylen vorhanden, wenn auch nur indirekt. Durch Bindung des Trioxymethylens an Gewebssäure entsteht eine wässrige Formaldehydlösung, die die restlichen Pulpenteile mumifiziert.

Von einer Gewebsfreundlichkeit der Gyfi'schen Triopaste kann nicht gesprochen werden. Ja man muß sich hüten, sie mit lebendem Gewebe in Berührung zu bringen. Nach Tabelle Nr. 1 erreichen die apicalen Reizercheinungen einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz.

Dieses sind die pastenförmigen Wurzelfüllmittel, denen vielfach noch Silberpulver hinzugesetzt wird, um die o. W. des Silbers auszunützen. Dann werden die Pasten mit Points, wie Elfenbeinstiften, Guttaperchaspitzen oder Silberstiften kombiniert. Dieselbe Kombination haben wir bei den festen Wurzelfüllmaterialien, die jetzt zu besprechen sind.

Die Anhänger der aseptischen Wurzelbehandlung glauben, die Kanäle nach streng durchgeführter Aseptik während der Behandlung gegen das Foramen als auch gegen die Kanalwände bakterien-dicht abschließen zu können. Hierzu wurden vielfach Zemente verwandt, besonders das Chlorzinkzement war beliebt. Werden sie aber über das Foramen hinausgestoßen, so werden sie nicht reaktionslos vertragen. Sie können dann nur sehr schwer oder überhaupt nicht entfernt werden. Auch Zusätze von Jodoform, Thymol oder Silberpulver können trotz der beabsichtigten bakteriziden Wirkung nicht befriedigen.

Diejenigen, die Guttapercha oder Chloropercha zum Füllen des Wurzelkanals verwenden, wollen ebenfalls durch geeignete Vorbehandlung einen sterilen evtl. erweiterten Kanal schaffen, der möglichst von allen Pulpenteilen befreit sein soll. Die Füllung soll ohne antiseptischen Zusatz in den Kanal gebracht werden. B u c k l e y ist für strikte Innehaltung aseptischer Maßnahmen und glaubt auf Grund klinischer Erfahrungen sagen zu können, daß die Guttapercha aseptisch in einen aseptischen Kanal gebracht, jahrelang so bleiben wird, trotzdem sie starke Schrumpfung aufweist.

#### Die Albrecht'sche Wurzelfüllung:

Albrecht fand, daß Reforcin bei Formalinzusatz erhärtete, daß durch Hinzufügen von Glycerin der Prozeß verlangsamt und das Endprodukt gelatinös wurde. Die Füllung, im flüssigen Zustand in den Kanal gebracht, sollte das organische Gewebe durchsetzen und in die feinsten Dentinkanälchen und Ramifikationen eindringen.

Dieses stellte in Verbindung mit ihrem festen Anliegen an die Kanalwand und ihrer Entfremdbarkeit ein Zusammentreffen vieler günstiger Eigenschaften dar, denen aber zwei große Nachteile gegenüberstehen. Das Füllmittel hatte eine starke Schrumpfungstendenz und infolge der roten Verfärbung des Dentins auch ein kosmetisches Fehlergebnis.

Das Füllen der Wurzelkanäle mit Silber stellt zweifellos einen neuen gangbaren Weg dar, den zuerst H o w e beschritt. Aus einer Silbernitratlösung mit 40%igem Formaldehyd fällte er Silber, das aber einmal die Gefahr der Verfärbung brachte und andererseits in

feiner o. W. wegen der Schwefelverbindungen, die aus den vorhandenen Eiweißsubstanzen stammten, bald nachließ. Außerdem ist das Verfahren sehr zeitraubend. Trebitsch (Wien) hat sich besonders mit der o. W. des Silbers befaßt. So beweist er, daß die keimtötende Wirkung durch Hochfrequenz, Diathermie und Einlegen der Stifte in  $H_2O_2$  noch verstärkt wird. Nach Untersuchungen von Stein ist Silberpulver unter bestimmten Verhältnissen imstande, eine 24stündige Streptokokkenboullion zu sterilisieren. Er füllte die Kanäle nach sorgfältiger Reinigung und Erweiterung mit Silberpulver, welches mit Jodoformzement vermischt wurde.

Kater hat sich besonders mit den Untersuchungen der Silberstifte nach Trebitsch, der Dieckschen Silbermanganitstifte und der Oppenheimschen Edelmetallstifte befaßt. Bei den Stiften nach Trebitsch und Oppenheim ist die o. W. gleich groß, sie erschöpft sich aber sehr in kurzer Zeit. Wenn man auch die Stifte durch  $H_2O_2$  wieder aktiviert, so vernichten doch sehr schnell die aus den Eiweißverbindungen stammenden Schwefelionen die erneute o. W. Die Zementhülle, die die Stifte umgibt, ist ebenfalls eine Barriere, welche die Silberionen nicht durchdringen können.

Bei den Oppenheimschen Gold-Silberstiften sind galvanische Ströme nachweisbar, aber Dauer und Stärke sind sehr minimal. Da sich dieses Element schnell erschöpft, kann man keine antiseptische Dauerwirkung erwarten.

Nach Kater ist der Diecksche Silbermanganitstift den beiden vorher beschriebenen an Wirkung überlegen. Sollte sich die o. W. durch das umgebende Zement auf die Dauer konstant zeigen, so wäre die Verwendung dieser Stifte allen anderen vorzuziehen, da ja die Silberstifte von den Geweben gut vertragen werden, wie Gretch mit seinen Silberfüllungen nachgewiesen hat.

Bei den Wurzelfüllungsmethoden haben wir also einige, die mit gutem Gewissen empfohlen werden können, allerdings kommen wir dem Ideal einer Wurzelfüllung, welche die anfangs gestellten sieben Forderungen erfüllt, vorläufig nur nahe, denn es gibt immer noch Mißerfolge. Dem Ziel am nächsten stehen die Walkhoffschen Pasten und der Diecksche Silbermanganitstift, falls nachgewiesen

wird, daß beim Letzteren die o. W. durch das umgebende Zement auf die Dauer konstant bleibt.

---

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle Herrn Professor P r o e l l für die liebenswürdige Überlassung des Themas meinen Dank auszusprechen. Ebenfalls danke ich Herrn Dr. J u n k , dessen Unterstützung ich bei der Anfertigung dieser Arbeit jederzeit gefunden habe.

### Literaturverzeichnis.

- Balters: Beiträge zur Frage der Wurzelbehandlung. D. M. f. Z. 1927.  
Credé: Lösliches Silber als inneres Antisepticum. Berl. Klin. W. Schr. 1901 Nr. 37.  
Dieck: Silbermanganit.  
Elander: Die Behandlung infizierter Wurzelkanäle. 1921.  
Heinemann: Die Wurzelfüllung.  
Howe: Verfilberungsmethode nach Howe. Misch 1928, 4, 2, S. 603.  
Hübner: Die Triopaste als Wurzelbehandlungsmethode und ihre Wirkung auf die Pulpenstümpfe und die Wurzelhaut.  
Mayerhöfer: Deutsche Zahnheilkunde. Heft 63, 1924.  
v. Nägeli: Über oligodynamische Erscheinungen in lebenden Zellen. Neue Denkschrift der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamte Naturwissenschaft, B. III. Abt. I. 1893. Zürich.  
Preiswerk: Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde.  
Port-Euler: Lehrb. der Zahnheilkunde: Bakterien der Pulpitis.  
Rebel: Wurzelbehandlung und -füllung nach Exstirpation entzündlicher, erkrankter Pulpen. D. M. F. Z. 1924—7.  
Selter: Ein Beitrag zur Reinfektion der Wurzelkanäle. Z. R. 1924—9.  
Stein: Untersuchung über die o. w. des Silbers mit besonderer Berücksichtigung seiner Brauchbarkeit zur Wurzelfüllung. Rdsch. 1930. Nr. 33.  
Treibitch: Zur Forschung nach der Ursache und möglichen Verstärkung der o. W. des Silbers. Rdsch. 1930. Nr. 29.  
— Über die Verwertung der Heilkraft des Silbers. Z. Rdsch. 1929. Nr. 24.  
— Neue Versuche über die Wurzelfüllung mit Silberspitzen. Z. R. 1930. Nr. 26.  
Walkhoff: Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde.  
— Behandlung der erkrankten Zahnpulpa. Dt. Zahnheilkunde. 1924. Heft 63.  
— Beitrag zur Pharmakologie der Chlorphenol-Kampfer-Präparate. Z. Rdsch. 1929. Nr. 23.  
— Erläuterung zu den heutigen Behandlungsprinzipien infizierter Zahnwurzeln. Z. R. XXXVIII. Nr. 12, 1929.  
— Mein System der medikamentösen Behandlung schwerer Erkrankungen der Zahnpulpa u. d. Periodontitiden.  
Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. 1925.  
Bearbeitet von: Prof. Dr. G. Frerichs, Prof. Dr. G. Arends, Prof. Dr. Z. Zörnig:

## Lebenslauf.

Ich, Fritz Vollmann, wurde am 16. 3. 07 als Sohn des Bauern Wilhelm Vollmann zu Meinerzhagen (Westf.) geboren. Bis zum 14. Lebensjahre besuchte ich die Volksschule bzw. Mittelschulklasse in Meinerzhagen, dann die Oberrealschule zu Gummersbach. Das Abitur bestand ich Ostern 1928. Im Wintersemester 1928/29 kam ich zur Universität Bonn und widmete mich dem Studium der Geodäsie. Dieses sagte mir jedoch nicht zu, und ab Wintersemester 32/33 wandte ich mich dem Studium der Zahnheilkunde zu. Mein Staatsexamen bestand ich im Herbst 1935. Seitdem habe ich mich in der Praxis betätigt.